

**TRICHOGENOUS AND HAIR-TONIC AGENT**

Patent Number: JP1068308  
Publication date: 1989-03-14  
Inventor(s): CHIBA TADAHIRO; others: 02  
Applicant(s): SHISEIDO CO LTD  
Requested Patent: ☐ JP1068308  
Application Number: JP19870225796 19870909  
Priority Number(s):  
IPC Classification: A61K7/06  
EC Classification:  
Equivalents: JP2810040B2

---

**Abstract**

---

**PURPOSE:** To obtain a trichogenous and hair-tonic agent having remarkably improved trichogenous and hair-tonic effect, by combining minoxidil with an ampholytic surfactant, semipolar surfactant and a nonionic surfactant having N in the molecule.

**CONSTITUTION:** The objective trichogenous and hair-tonic agent contains (A) minoxidil [2,4-diamino-6-piperidinopyrimidine-3-oxide (a remedy for hypertension having remarkable vasodilating effect and causing hypertrichosis as a side effect)], (B) one or more compounds selected from ampholytic surfactant (e.g. N,N-dimethyl-N-lauryl-N-carboxymethylammonium betaine) and semipolar surfactant (e.g. lauryldimethylamine oxide) and (C) one or more nonionic surfactant having N in the molecule (e.g. fatty acid alkanol amide).

---

Data supplied from the esp@cenet database - I2

1989-68308

[number illegible] name of invention Hair growth and regrowth promoter

## Specifications

### 1. [Name of invention]

Hair growth and regrowth promoter

### 2. [Scope of patent claims]

Hair growth and regrowth promoter characterised by combining 2,4 diamino-6- piperidinopyrimidine-3-oxide, one or more selected from the group of amphiprotic surfactants and semipolar surfactants and one or more selected from the group of nonionic surfactants comprising the nitrogen atom in its molecule.

### 3. Detailed description of invention

#### [Industrial Field of Application]

This invention relates to combining 2,4 diamino-6-piperidinopyrimidine-3-oxide, a well-known chemical compound, and certain kinds of surfactants for the use as a hair growth and regrowth promoter. Explained further in detail, this relates to hair growth and regrowth promoter characterised by combining 2,4 diamino-6-piperidinopyrimidine -3-oxide, one or more selected from the group of amphiprotic surfactants and semipolar surfactants and one or more selected from the group of nonionic surfactants comprising nitrogen atom in its molecule. This invention is to be used in fields of pharmaceutical or cosmetic products.

#### [Prior art]

2,4 diamino-6-piperidinopyrimidine-3-oxide, is a chemical compound, which is often referred to as Minoxidil (Minoxidil hereafter). It is used as internal medicine for hypertension with its significant vascular dilation effects, while it's known that hypertrichosis phenomenon occurs as a side effect. Based on this knowledge, it is [illegible] that topical and external application of Minoxidil works for hair loss treatment. (Journal, Royal Society of Medicine 75, 063 (1982); British Medical Journal 287,1015 (1983); Journal of Investigational Dermatology) 82,515 (1984); Journal of Investigational Dermatology, 12, 00 (1983) etc)

Descriptions of hair growth promoters comprising combinations of Minoxidil and Thyroid hormone (Special release 1986-number 155311) or Minoxidil and antiandrogen agents (Special release 1986-number 185312), have also been published.

#### [Problems that this invention attempts to solve]

However, hair growth and regrowth efficacy was not sufficient in either case and development of an agent with improved hair growth/regrowth efficacy

has been sought after.

**[Means of solving the problem]**

The present inventors further continued their research [illegible] to obtain Minoxidil agent with high hair growth/regrowth efficacy and as a result discovered that hair growth/regrowth efficacy dramatically improves when Minoxidil is combined with one or more selected from the group of amphiprotic surfactants and semipolar surfactants and one or more selected from the group of nonionic surfactants comprising a nitrogen atom in its molecule. The present invention is based on this understanding.

In other words, this invention is a hair growth and regrowth promoter characterised by combining Minoxidil and one or more selected from the group of amphiprotic surfactants and semipolar surfactants and one or more selected from the group of nonionic surfactants comprising a nitrogen atom in its molecule.

The present invention is especially efficient in terms of its hair growth and regrowth promotion effects and useful in pharmaceutical and cosmetic fields. Composition of this invention will be detailed below.

Minoxidil used for this invention is generally recognised substance as a hypertension medicine and a chemical compound represented by the following formula.

The concentration of Minoxidil is approximately 0.001~10% by weight (following %s indicate % by weight). Used as hair growth and regrowth promoter, it is more potent at higher concentrations. However, it is preferable to keep it 10% or under considering the occurrence of side effects. More preferable concentration being 0.01~7%.

Amphiprotic surfactants used for this invention include; carboxy betaines such as N, N-dimethyl-N-lauryl-N-carboxy methyl ammonium betaine; imidazoline derivatives such as 2-lauryl-N-carboxyethyl-N-hydroxy ethyl imidazolium betaine; 2-lauryl-N-carboxymethyl-hydroxy ethyl imidazolium betaine; amino carboxylate such as N-palm alkyl-β-amino propionate acid soda sodium, N-palmalkyl-β-amino proplionate – di- sulfate soda sodium; sulfobetaine and aminobetaine etc.

Semipolar surfactants used for this invention include aminoxide such as lauryl dimethyl aminoxide, hiss-(2-hydroxyethyl) lauryl aminoxid.

One or more selected as desired from the group of above amphiprotic and semipolar surfactants will be used for this invention.

Also, nonionic surfactants comprising a nitrogen atom in its molecules include aliphatic acid alkanol amide, polyoxiethylene aliphatic acid amide, ester from alkanolamine, polyoxiethylene alkylamine.

The mixture ratio of one or more surfactant/s selected from the group of amphiprotic surfactants and one or more surfactant/s selected from the group of nonionic surfactants comprising a nitrogen atom in its molecule are 20 :1or 1 :40, preferably 10:1 or 1:20in a molecule.

The mixture ratio of one or more surfactant/s selected from the group of

amphiprotic surfactants and one or more surfactant/s selected from the group of nonionic surfactants comprising a nitrogen atom in its molecule are 0.001~10%, preferably 0.01~5% by the total amount of both. Hair growth and regrowth effect is not seen when it is under 0.001% and it is not dermatologically safe when this exceed 10%.

The hair growth and regrowth promoters related to this invention may contain; Minoxidil, antiseptics generally used for hair growth/ regrowth promoters such as salicylic acid, resorcin and hexachlorophen, nicotinic acid, Vitamin E, Vitamin A acid, pantothenic acid, ethynylestradiol, Hinokitiol, glycyrrhizic acid, biotin and other agents.

Also, the hair growth and regrowth promoter related to this invention may contain various components generally used for pharmaceuticals and cosmetics; that is, water-based components, powder components, oil components, surfactants other than the above compositions, organic solvents, moisturisers, thickeners, preservatives, antioxidants, perfume and colours, as long as they do not impede the efficacy of this invention.

#### **【Effectiveness of this invention】**

This invention is a hair growth and regrowth promoter with outstanding hair growth and regrowth efficacy, achieved by combining Minoxidil, and one or more selected from the group of amphiprotic surfactants and semipolar surfactants and one or more selected from the group of nonionic surfactants comprising a nitrogen atom in its molecule.

It may be incorporated into any other forms suitable for external use, such as gel, milk, cream or aerosol, by utilising components generally used for pharmaceuticals and cosmetics.

## ⑫ 公開特許公報(A)

昭64-68308

⑮ Int.Cl.<sup>4</sup>

A 61 K 7/06

識別記号

庁内整理番号

7430-4C

⑭ 公開 昭和64年(1989)3月14日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

⑮ 発明の名称 発毛、養毛促進剤

⑰ 特 願 昭62-225796

⑱ 出 願 昭62(1987)9月9日

⑲ 発 明 者 千 葉 忠 弘 神奈川県横浜市港北区新羽町1050番地 株式会社資生堂研究所内

⑲ 発 明 者 宮 沢 清 神奈川県横浜市港北区新羽町1050番地 株式会社資生堂研究所内

⑲ 発 明 者 石 野 章 博 神奈川県横浜市港北区新羽町1050番地 株式会社資生堂研究所内

⑳ 出 願 人 株式会社資生堂 東京都中央区銀座7丁目5番5号

## 明 細 書

## 1. 発明の名称

発毛、養毛促進剤

## 2. 特許請求の範囲

2, 4-ジアミノ-6-ピペリジノピリミジン-3-オキサイドと、両性界面活性剤及び半両性界面活性剤からなる群より選ばれた一種又は二種以上及び、分子内に窒素原子を有する非イオン性界面活性剤の一種又は二種以上とを含有することを特徴とする発毛、養毛促進剤。

## 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は公知化合物である2, 4-ジアミノ-6-ピペリジノピリミジン-3-オキサイドとある種の界面活性剤を組み合わせ、発毛、養毛促進剤として用いることに関する。更に詳しくは、2, 4-ジアミノ-6-ピペリジノピリミジン-3-オキサイドと、両性界面活性剤及び半両性界面活性剤からなる群より選ばれた一種又は二種以上及び、分子内に窒素原子を有する非イオン性界

面活性剤の一種又は二種以上とを含有することを特徴とする発毛、養毛促進剤に関する。本発明は、医薬品或は化粧品分野において利用される。

〔従来の技術〕

2, 4-ジアミノ-6-ピペリジノピリミジン-3-オキサイドは一般名でミノキシジルと称される(以下、ミノキシジルと称す)化合物で、その著しい血管拡張作用のため、内服による高血圧治療剤として用いられているが、副作用として多毛症現象が生ずることが知られている。

この知見に基づいて、ミノキシジルを外用局所適用することにより脱毛の治療に効果のあることが報告されている〔ジャーナル・ロイヤル・ソサエティー・オブ・メディシン(J. ROYAL. Soc. Med.), 75, 983(1982); プリティッシュ・メディカル・ジャーナル(British Med. J.), 287, 1015(1983); ジャーナル・オブ・インベスティゲイショナル・ダーマトロジー(J. Invest. Dermatol.), 82, 515(1984); ジャーナル・オブ・インベスティゲイショナル・ダーマトロジー, 82, 90(1984)、他〕。

又、ミノキシジルと甲状腺ホルモン(特開昭61-165311号)、ミノキシジルと抗アンドロジェン剤(特開昭61-165312号)などの組み合わせで、これらを養毛成分として含有する養毛化粧料が開示されている。

〔発明が解決しようとする問題点〕

しかし、これらのいずれの場合でも発毛、養毛促進効果は十分とはいえず、更に、発毛、養毛促進効果の優れた製剤の開発が望まれていた。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明者らは、更に発毛、養毛促進効果の高いミノキシジル製剤を得るべく鋭意研究を続けた結果、ミノキシジルと両性界面活性剤及び半極性界面活性剤からなる群より選ばれた一種又は二種以上及び、分子内に窒素原子を有する非イオン性界面活性剤の一種又は二種以上とを配合することにより、発毛、養毛促進効果が飛躍的に増大することを発見した。本発明は、この知見に基づく。


すなわち、本発明は、ミノキシジルと両性界面活性剤及び半極性界面活性剤からなる群より選ば

れた一種又は二種以上及び、分子内に窒素原子を有する非イオン性界面活性剤の一種又は二種以上とを含有することを特徴とする発毛、養毛促進剤である。

本発明品は、特に発毛、養毛促進に優れ、医薬品、化粧料の分野で有用である。

以下、本発明の構成について詳述する。

本発明に使用するミノキシジルは高血圧治療剤として公知の物質であり、次式で示される化合物である。



ミノキシジルの配合量は、0.001~10重量%(以下、%は重量%を表す)程度である。発毛、養毛促進剤として使用する場合、配合量は多い程発毛、養毛促進効果は大であるが、多量に用いられた時の副作用の発現等を考えて10%以下が好ましい。より好ましくは0.01~7%である。

本発明で用いられる両性界面活性剤としては、N,N-ジメチル-N-ラウリル-N-カルボキシメチルアンモニウムベタイン、N,N-ジメチル-N-オレイル-N-カルボキシメチルアンモニウムベタイン等のカルボキシベタイン、2-ラウリル-N-カルボキシエチル-N-ヒドロキシエチルイミダゾリウムベタイン、2-ラウリル-N-カルボキシメチル-N-ヒドロキシエチルイミダゾリウムベタイン等のイミダゾリン誘導体、N-ヤシアルキル-β-アミノプロピオン酸ソーダ塩、N-ヤシアルキル-β-イミノプロピオン酸-ジソーダ塩等のアミノカルボン酸塩、スルホベタイン、アミノベタイン等である。

本発明で用いられる半極性界面活性剤は、ラウ

リルジメチルアミノオキシド、ビス-(2-ヒドロキシエチル)ラウリルアミノオキシド等のアミノオキシド等である。

本発明においては、上記両性界面活性剤及び上記半極性界面活性剤からなる群より選ばれる一種又は二種以上が任意に使用される。

又、本発明に用いられる分子内に窒素原子を有する非イオン性界面活性剤としては、脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエチレン脂肪酸アミド、アルカノールアミンのエステル、ポリオキシエチレンアルキルアミン等である。

両性界面活性剤及び半極性界面活性剤から選ばれる一種または二種以上の界面活性剤と、分子内に窒素原子を有する非イオン性界面活性剤から選ばれる一種または二種以上の界面活性剤との混合比率は、分子比で20:1ないしは1:40、好ましくは10:1ないしは1:20である。

両性界面活性剤及び半極性界面活性剤から選ばれる一種または二種以上の界面活性剤と、分子内に窒素原子を有する非イオン性界面活性剤から選

ばれる一種または二種以上の界面活性剤との配合量は、両者の合計量で0.001~10%であり、好ましくは0.01~5%である。0.001%未満では、発毛、養毛促進効果の増大が見られず、10%を超えると、皮膚安全性が良くなる。

本発明に係わる発毛、養毛促進剤は、ミノキシジルの他に、一般に発毛、養毛促進剤に用いられるサリチル酸やレゾルシン及びヘキサクロロフェンのような殺菌剤や、ニコチン酸、ビタミンE、ビタミンA酸、パントテン酸、エチニールエストラジオール、ヒノキチオール、グリチルレチン酸、ビオチンその他のビタミン類、脂肪酸類、アミノ酸、レチノール、レチニルパルミテートその他のレチノイド類等の薬剤を配合することができる。

又、本発明に係わる発毛、養毛促進剤は、本発明の効果を損なわない限り、医薬品、化粧品に一般に用いられる各種成分、即ち水性成分、粉末成分、油分、上記の構成成分以外の界面活性剤、有機溶媒、保湿剤、増粘剤、防腐剤、酸化防止剤、

香料、色剤等を配合することができる。

#### 〔発明の効果〕

本発明は、ミノキシジルと両性界面活性剤及び半極性界面活性剤からなる群より選ばれた一種又は二種以上及び、分子内に窒素原子を有する非イオン性界面活性剤の一種又は二種以上とを含有することにより、発毛、養毛促進効果が極めて優れた発毛、養毛促進剤である。又、医薬品、化粧品に一般に用いられている成分を使用することで、ゲル、乳液、クリーム、エアゾールその他の外用剤に適するどのような剤形にも応用することができる。

#### 〔実施例〕

本発明に基づく実施例及び効果を比較例とともに以下に示すが、本発明はこれにより限定されるものではない。

#### 実施例1 ローション

①	ミノキシジル	2.0 %
②	イソプロピルアルコール	80.0
③	N, N-ジメチル-N-ラウリル	2.8

-N-カルボキシアニモニウムベタイン

④	ラウリン酸ジエタノールアミド	0.31
⑤	精製水	残余

#### 〔製法〕

①を②に添加し溶解する。これに、⑤に④、③を添加溶解したものを加え、攪拌混合して均一な透明なローションを得た。

#### 比較例1

①	ミノキシジル	2.0 %
②	イソプロピルアルコール	80.0
③	精製水	残余

#### 〔製法〕

実施例1に準ずる。

#### 〔発毛試験〕

実施例1及び比較例1、市販製剤(ミノキシジル2%配合)の発毛試験を、毛周期の休止期にあるC3H/HeNCrマウスを用い、小川らの方法[ノーマル アンド アブノーマル エピダーマル ディファレンティエーション(Normal and Abnormal E

pidermal Differentiation)、M.Seiji及びI.A.Bernstein編集、第159-170頁、1982年、東大出版]により試験を行った。すなわち、マウスを1群10匹とし、無塗布、実施例1及び比較例1、市販製剤の4群に分け、バリカン及びシェーバーでマウスの背部を剃毛し、それぞれの試料を1日1回0.1mlずつ塗布した。

各試料の発毛効果はマウス背部の発毛部分を測定して、面積比によって比較した。

#### (試験結果)

試料塗布11日目までは全群に発毛は認められなかった。12日目より実施例1の群のマウスの背部が黒味を帯び、生長期毛となった。実施例1の群では塗布15日目にマウスの約半数が生長期毛に入り、無塗布、比較例1及び市販製剤の群では、塗布21日目に若干のマウスが生長期に移行した。塗布40日後の、マウス背部の発毛部分の面積比を表-1に示す。

表-1

試験試料	40日後の発毛部面積比
無 塗 布	1 2 %
実施例 1	7 5
比較例 1	2 0
市販製剤	2 2

表-1より明らかなように、毛の発毛に対する効果は、比較例1及び市販製剤の群に比して、実施例1の群で著しい効果があることが認められた。

## 実施例2 ローション

①	ミノキシジル	2.0 %
②	ベンジルアルコール	10.0
③	エチルアルコール	55.0
④	2-ドデシル-1-ヒドロキシ エチル-1-カルボキシメチルイ ミダゾリウムベタイン	0.04
⑤	ポリオキシエチレン(10モル)オ レイルアミン	0.63

表-2

被 験 者	年 齢	発 毛	抜 毛
A	3 6	無 効	有 効
B	5 0	無 効	有 効
C	4 3	有 効	有 効
D	3 3	有 効	有 効
E	4 9	無 効	有 効
F	2 9	有 効	有 効
G	3 1	有 効	有 効
H	3 6	有 効	有 効
I	3 2	有 効	有 効
J	3 1	有 効	有 効

表-2より明らかなように、実施例2のローションは、抜毛に対しては全員に有効であり、発毛に対しても70%という高い有効率を示した。

## 実施例3 ローション

①	ミノキシジル	10.0 %
②	ベンジルアルコール	20.0
③	イソプロピルアルコール	55.0

## ⑥ 精製水

残余

## 〔製法〕

①を④に添加溶解し、②を加え混合する。これに、④、⑤を①に加えて溶解したものを添加しよく混合した。

## 〔効果〕

実施例2のローションを、男性型脱毛症及び抜毛の症状を呈する健康人10名(男子、20~50才)に1日1~2回、2~4mlずつ3カ月にわたって適用したところ、表-2のような結果を得た。

④	2-ラウリル-1-ヒドロキシ エチル-1-カルボキシメチルイ ミダゾリウムベタイン	1.2
⑤	N, N-ジメチル-N-ラウリ ル-N-カルボキシアニモニウム ベタイン	1.0
⑥	ラウリン酸ジエタノールアミド	0.0
⑦	精製水	残余

## 〔製法〕

実施例2に準じる。

## 実施例4 ローション

①	ミノキシジル	6.0 %
②	イソプロピルアルコール	20.0
③	エチルアルコール	50.0
④	ジプロピレングリコール	4.0
⑤	N, N-ジメチル-N-ラウリ ル-N-カルボキシメチルアンモ ニウムベタイン	2.0
⑥	ラウリルジメチルアミノオキシド	0.0
⑦	ラウリン酸ジエタノールアミド	0.6



④ 精製水	残余
〔製法〕	
実施例2に準ずる。	
実施例5 ローション	
① ミノキシジル	1.0 %
② ベンジルアルコール	10.0
③ エチルアルコール	50.0
④ 1, 3-ブチレングリコール	5.0
⑤ グリセリン	5.0
⑥ 2-ラウリル-1-ヒドロキシ エチル-1-カルボキシメチルイ ミダゾリウムベタイン	1.4
⑦ ラウリルジメチルアミンオキシド	0.9
⑧ ラウリン酸ジエタノールアミド	0.8
⑨ 精製水	残余

## 〔製法〕

実施例2に準ずる。

実施例6 ローション	
① ミノキシジル	5.0 %
② ベンジルアルコール	15.0

③ イソプロピルアルコール	10.0
⑦ エチルアルコール	50.0
④ 1, 3-ブチレングリコール	1.0
⑤ 香料	適量
⑥ 2-ラウリル-1-ヒドロキシ エチル-1-カルボキシメチルイ ミダゾリウムベタイン	0.7
⑩ ポリオキシエチレン(10モル)オ レイルアミン	0.8
⑫ ポリオキシエチレン(15モル)オ レイルアルコール	4.0
⑬ 精製水	残余

## 〔製法〕

⑦に③、①、②、④、⑤、⑥、⑩を順次添加し攪拌混合溶解する。これに、⑫に⑪、⑬、⑭を加え混合溶解したものを添加し、よく攪拌混合した後、ろ過しヘアトニックを得た。

## 実施例8 ゲル状養毛剤

① ミノキシジル	0.02 %
② エチニールエストラジオール	0.002

③ イソプロピルアルコール	50.0
④ ポリエチレングリコール200	5.0
⑤ 1, 3-ブチレングリコール	7.0
⑥ N, N-ジメチル-N-ラウリ ル-N-カルボキシメチルアンモ ニウムベタイン	2.0
⑦ 2-ラウリル-1-ヒドロキシ エチル-1-カルボキシメチルイ ミダゾリウムベタイン	0.7
⑩ ラウリルジメチルアミンオキシド	0.9
⑪ ラウリン酸ジエタノールアミド	0.8
⑬ 精製水	残余

## 〔製法〕

実施例2に準じる。

## 実施例7 ヘアトニック

① ミノキシジル	0.1 %
② ヒノキチオール	0.01
③ レチニルパルミテート	0.1
④ ビタミンEアセテート	0.05
⑤ ビタミンB <sub>6</sub>	0.1

⑥ ビタミンEアセテート	0.05
⑦ エチルアルコール	50.0
⑧ 1, 3-ブチレングリコール	4.0
⑨ グリセリン	1.0
⑩ N, N-ジメチル-N-ラウリ ル-N-カルボキシメチルアンモ ニウムベタイン	0.3
⑪ ラウリン酸ジエタノールアミド	2.75
⑫ ポリオキシエチレン硬化ヒマシ 油(P.O.E.; 60モル)	2.0
⑬ ヒドロキシプロピルセルロース	1.2
⑭ カルボキシビニルポリマー	0.8
⑮ ジイソプロパノールアミン	0.3
⑯ 精製水	残余

## 〔製法〕

④に①、②、③、⑤を加え溶解する。これに⑥を分散させ組成物(A)を調製する。

⑤に⑦を分散させた後、⑧、⑨、⑩、⑪を添加しよく混合溶解して組成物(B)を得る。

組成物(A)を攪拌しながら、これに組成物(B)

を加え混合する。更に攪拌しながら、⑤を添加してよく混合してゲル状養毛剤を得た。

#### 実施例9 乳液

①	ミノキシジル	0.03 %
②	エチルアルコール	25.0
③	グリセリン	5.0
④	1, 3-ブチレングリコール	15.0
⑤	流動パラフィン	3.0
⑥	セチルアルコール	0.2
⑦	ドデシルジメチルアミノキシ	1.2
ド		
⑧	ポリオキシエチレン(15モル)オ	3.5
	レイルアミン	
⑨	カルボキシビニルポリマー	0.2
⑩	香料	適量
⑪	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ	1.0
	油(P.O.E.; 40モル)	
⑫	防腐剤	適量
⑬	ヘキサメタリン酸ナトリウム	0.03
⑭	水酸化カリウム	0.03

①	グリセリン	5.0
⑦	流動パラフィン	1.0
⑧	ヒマシ油	3.5
⑨	香料	適量
⑩	N, N-ジメチル-N-ラウリ	1.2
	ル-N-カルボキシメチルアンモ	
	ニウムベタイン	
⑪	ラウリン酸ジエタノールアミド	1.8
⑫	グリセリンモノ脂肪酸エステル	1.5
⑬	防腐剤	適量
⑭	粘土鉱物(ベントナイト)	6.0
⑮	精製水	残余

#### [製法]

④に①を溶解した後、⑤を加え混合する。これに、⑥の一部に⑦、⑧、⑨、⑩を添加して溶解したものを加えよく混合する。これを組成物(A)とする。

⑦に②、③、④、⑤、⑥を順次添加し、70°Cに加熱して溶解混合する。これを組成物(B)とする。

#### ⑮ 精製水

残余

#### [製法]

②に①、④を添加し溶解する。これを組成物(A)とする。

④の一部に①と⑤の一部を添加し50°Cに加熱し溶解混合する。これをホモミキサーで攪拌しながら、⑥に⑦、⑧、⑨を加え70°Cに加熱して混合溶解したものを徐添しながら乳化する。これを組成物(B)とする。

⑤の残部に①、④の残部、⑦、⑧、⑨を加え溶解した後、これを攪拌しながら、組成物(B)、組成物(A)を順次添加し混合する。更にこれに⑩を加え、ホモミキサーで処理した後、冷却し乳液を得た。

#### 実施例10 クリーム

①	ミノキシジル	0.05 %
②	ビタミンEアセテート	0.05
③	イソプロピルアルコール	5.0
④	エチルアルコール	20.0
⑤	1, 3-ブチレングリコール	10.0

温度を70°Cに保ち、組成物(A)を攪拌しながら組成物(B)を徐々に添加し、予備乳化した後、ホモミキサーで乳化する。

これを、あらかじめ⑤の残部に⑥を添加分散しておいたものに攪拌しながら加え、冷却しクリーム得た。

#### 実施例11 エアゾール

#### 原液処方

①	ミノキシジル	0.6 %
②	エチニールエストラジオール	0.001
③	パントテニルエチルエーテル	0.05
④	ベンジルアルコール	5.0
⑤	イソプロピルアルコール	20.0
⑥	1, 3-ブチレングリコール	10.0
⑦	2-ラウリル-1-ヒドロキシ	0.34
	エチル-1-カルボキシメチルイ	
	ミダゾリウムベタイン	
⑧	ポリオキシエチレン(10モル)オ	6.4
	レイルアミン	
⑨	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ	1.0

油(P.O.E.; 60モル)

⑩	香料	適量
⑪	エチルアルコール	残余

充填処方

⑫	原液	30.0 %
⑬	フレオン 12	42.0
⑭	フレオン 13	28.0

## 〔製法〕

⑪に①～⑩を順次加え混合溶解し原液⑫を得る。

原液⑫を処方量充填し、バルブ装着後、ガス⑬、⑭を順次処方量充填しエアゾールを得た。

特許出願人 株式会社 資生堂